

Kędzierzawość liści brzoskwini

Kędzierzawość liści brzoskwini to najczęściej występująca oraz najgroźniejsza choroba grzybicza brzoskwiń. Grzyb ten poraża głównie brzoskwinie, ale także nektaryny, czasami morele. Choroba niezwalczana może prowadzić do zamarcia roślin, niekorzystnie wpływa na kondycję drzewek i obfitość ich owocowania.



Objawy występowania kędzierzawości liści brzoskwini

Pierwsze objawy widoczne są już wiosną, w momencie pojawienia się liści. Początkowo na liściach tworzą się jasnożółte przebarwienia. W miarę rozwoju infekcji liście deformują się i wykręcają, przybierając równocześnie barwę od pomarańczowej do czerwonej. Porażone liście stają się bardzo kruche i przedwcześnie opadają z drzewa. Drzewo, próbując się zregenerować, drugi raz w sezonie wegetacyjnym wypuszcza liście. Prowadzi to do osłabienia rośliny, która ma niższą odporność na niskie temperatury, suszę oraz inne warunki stresowe. Czasami dochodzi również do porażenia kwiatów i owoców.

Patogen, wywołujący chorobę, zimuje na korze, pędach oraz na okrywach pączków. W momencie pęknięcia pączków dochodzi do zakażenia liści, grzyb wnika pod skórę liścia i jest już za późno na zwalczanie choroby. Zabiegi środkiem przeciugrzybicznym należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, gdy drzewa znajdują się w okresie bezlistnym. Zabieg opryskiwania należy przeprowadzić podczas dodatniej temperatury powietrza. Najlepiej wykonać go kilkakrotnie, ostatni w okresie nabrzmiewania pąków.

Zatem jeśli znajdziemy dzień bez opadów deszczu i z dodatnią temperaturą to już można wykonać oprysk.

Na rynku jest wiele skutecznych preparatów, na pewno sprzedawcy w sklepach ogrodniczych coś doradzą. Pamiętajmy o BHP podczas oprysku, mamy przecież teraz dużo maseczek i można wykorzystać.

